

## النتبؤ بالقابلية التناسلية لأبقار حليب الهولشتاين من خلال تحليل صفات الخطوط الجلدية (البصمة) على الأنف .

نصر نوري الأنباري\* عبد الرزاق لعبيبي الربيعي\*\* ليث ياسين عارف الباجلاني\*\*\*

\*قسم الثروة الحيوانية- كلية الزراعة - جامعة بغداد.

\*\*قسم تقنيات الإنتاج الحيواني - الكلية التقنية/ المسيب- هيئة التعليم التقني.

\*\*\* قسم الإنتاج الحيواني - معهد كالأر- هيئة التعليم التقني.

### الخلاصة

شملت الدراسة اختبار 246 بقرة هولشتاين عائدة لمحطة النصر التابعة للشركة المتحدة للثروة الحيوانية المحدودة في الصويرة، تم خلاله تصوير المخطم لكل بقرة في عينة الأبقار المذكورة اعلاه باستعمال (كاميرا فيديو ديجيتال ) لتحديد نوع الخطوط الجلدية على الأنف بعد نقل الصور الى الكومبيوتر وتحليلها، إذ تم تسجيل الصفات المتمثلة بالقوس البسيط ( Simple Arch ) والشوكة (Fork) والإنحباس ( Enclosure ) والجزيرات (Islands) والخطوط الجلدية القصيرة ( Short Ridges) فضلا عن عرض المخطم (Muzzle Width)، ومن ثم دراسة العلاقة (النتبؤ) بين الخطوط الجلدية على المخطم وعدد من الصفات التناسلية (المدة بين الولادة والتلقيح المثمر ، عدد التلقيحات اللازمة للاخصاب، الفترة بين الولادتين)، بينت نتائج الدراسة ان هنالك العديد من معاملات الانحدار للصفات التناسلية المدروسة على صفات المخطم المختلفة مرغوبة ومعنوية يمكن اعتمادها في تطبيق استراتيجيات التحسين الوراثي من خلال الانتخاب غير المباشر لتحسين مؤشرات الكفاءة التناسلية اعتمادا معالم المخطم وبوقت مبكر لتعظيم العائد الاقتصادي.

### المقدمة

يعد العالم Galton أول من نشر كتاباً في عام 1892 ثم كتابين عام 1893 و 1895 عن مفهوم البصمة الوراثية وتحديد بصمة الاصابع لدى الانسان بهدف التحقق من الشخص ودعا إلى استعمال هذه التقانة على أساس علمي وأضاف بان بصمة الاصابع للأشخاص تعد شيئاً مميزاً ومعقداً نوعاً ما، كما أفاد بأن الخطوط الجلدية ( Dermatoglyphics ) تعبر عن الأنماط الجلدية، وان الكلمة مشتقة من الكلمة اليونانية " Derma "، وتعني جلد، و " Glyph "، وتعني خط ، وهي تشمل الأشكال المتكونة بوساطة الحافات الجلدية في مناطق مختلفة من الجسم مثل راحة اليد و اصابعها واصابع القدم وأسفل القدم والمخطم وغيرها أن دراسة أنماط الخطوط الجلدية هي جزء من دراسة علم الأجناس (anthropology)، وفي تطبيق القوانين الخاصة بتحديد الهوية، وكذلك في المجال الطبي كأشكال سريرية وكمؤشر وراثي ، خصوصاً في حالات التشوه الكروموسومي ( Parna وآخرون ، 1996) . إن منشأ الخطوط الجلدية هو افضل توضيح للتكيف الميكانيكي الحيوي للإدراك الحسي، والذي ينتج تأثيرات ميكانيكية متعددة الاتجاه على الجلد ، وهذه المؤثرات ينبغي أن تتناسب مع السيطرة الدقيقة للحركة والضغوط الساكنة والتي تتطلب ارتداداً منظماً لذلك من سطح الجلد، أما في عالم البحار فإن الطريقة المساعدة في تمييز افراد الحيتان الرمادية في المكسيك هي الخطوط الجلدية للمفصل (Knuckle Ridges) والعلماء متأكدون من أن هذه الخطوط الجلدية تكون جميعها متباينة لكل انواع الحيتان (Maciej، 2005).

تاريخ استلام البحث 20 / 4 / 2011 .


تاريخ قبول النشر 3 / 6 / 2011 .

إن استعمال عينات الشعر للتحقق من هوية الحيوان تكون مفضلة من قبل المختصين (Wilcox، 1998 و Johnson، 1999 و Olson، 2000 و Shmael، 2001 و Shlachter،


2003 و Bindusar ، 2003). إن استعمال هذه التقنية الحيوية الصافية بيئياً وغير المكلفة (Olson ، 2000 و Buzz ، 2004) ، يفتح طريقاً جديداً لتطوير صناعات تربية الحيوان ذات الكفاءة، لذا خطط عدد من الباحثين لاستمرار هذه الدراسات على المدى المنظور بالتنسيق مع المختصين، ومزارع تربية الحيوان ومعاهد البحوث الزراعية، وكان هدف هذه الدراسات هو اختبار الارتباطات بين الخطوط الجلدية لمخطم الماشية والقيم والمقاييس التربوية مثل إنتاج الحليب الكلي ومكوناته من البروتين والدهن وديناميكية الزيادة الوزنية وطول موسم الحليب والخصائص السلوكية للحيوان، ومقاومة العوامل الخارجية والميل إلى الإصابة بالأمراض والقدرة المناعية (Immunological ability) للحيوانات (Simon و Goldstein ، 1935 و Tower ، 1955 و Parma و آخرون ، 1996). نظراً لانعدام الدراسات الجارية فيما يخص علاقة الخطوط الجلدية على الأنف (المخطم) بتناسل الأبقار، لذا هدف البحث إلى تحديد نوع الخطوط الجلدية على الأنف لعينة من ابقار هولشتاين والمتمثلة بالقوس البسيط والشوكة والجزيرة والانحباس والخطوط الجلدية القصيرة، ودراسة العلاقة (التنبؤ) بين الخطوط الجلدية على الأنف وعدد من الصفات التناسلية للعينة المدروسة من خلال تقدير معامل الانحدار البسيط لكل صفة من الصفات التناسلية على كل صفة من صفات الأنف المقاسة.

### المواد وطرائق البحث


شملت الدراسة تصوير بصمة المخطم (246) بقرة هولشتاين أعمارها تراوحت بين (3-5) سنوات من محطة النصر التابعة للشركة المتحدة للثروة الحيوانية في الصويرة ، حيث تم تحديد خمسة أشكال للخطوط الجلدية والمخطم (القوس البسيط، الشوكة، الانحباس، الجزيرات والخط الجلدي القصير) فضلاً عن عرض المخطم، كما هو مبين في الأشكال (1-6)، وتم قياس هذه الأشكال في أربع مناطق على المخطم (المربع الأيمن العلوي، المربع الأيسر العلوي، المربع الأيمن السفلي، المربع الأيسر السفلي)، وتم تصوير هذه الأشكال في المناطق أعلاه لكل بقرة بواسطة كاميرا فيديو، وتم تحليل الصور باستخدام برنامج Adobe Photoshop ، وقد تم أخذ الصور بعد أن تم حصر الأبقار بالحصارات الموجودة في المعالف بشكل جماعي أثناء فترة تقديم العلف، أذ تم مسك رأس كل بقرة من قبل شخص مساعد، ومسح مخطمها بقطعة قماش نظيفة ومن ثم رفع المخطم وتثبيتته باتجاه عدسة الكاميرا. أستعمل البرنامج الجاهز SAS (2004) لاستخراج معادلات الخط المستقيم ، من خلال تقدير معامل الانحدار لكل صفة تناسلية على كل نوع من الخطوط الجلدية وحساب معامل التحديد ( $R^2$ ) لكل معادلة.



شكل 1. مخطم البقرة الذي أخذت منه القياسات المؤشرة على الشكل.




شكل 2. القوس البسيط في مخطم بقرة هولشتاين فريزيان.




شكل 3. الشوكة في مخطم بقرة هولشتاين فريزيان.





شكل4. الانحباس في مخطم بقرة هولشتاين فريزيان.



شكل5. الجزيرة في مخطم بقرة هولشتاين فريزيان.



شكل6. الخط الجلدي القصير في مخطم بقرة هولشتاين فريزيان.

### النتائج والمناقشة

**انحدار الصفات التناسلية على القوس البسيط (Simple Arch) على المخطم**  
 يتضح من الجدول (1) بأن أنحدار المدة بين الولادة والتلقيح المثمر على القوس البسيط معنوي (-6.31) يوم، فإن انحدار عدد التلقيحات اللازمة للإخصاب على القوس البسيط كان سالبا ومعنويا ( $P < 0.01$ ) وبلغ معاملته (-0.061) تلقيحة، وبنفس الإتجاه كان معامل الإنحدار للفترة بين الولادتين (-10.84) يوم ( $P < 0.05$ )، وان تقليل عدد التلقيحات اللازمة للإخصاب وكذلك الفترة بين الولادتين من خلال انتخاب العجلات لصفة القوس البسيط وبوقت مبكر من العمر (بعد الولادة مباشرة) من شأنه ان يسرع برامج التحسين الوراثي، وتبين قيم معامل التحديد ( $R^2$ ) لإنحدار الصفات المختلفة على القوس البسيط امكانية الانتخاب غير المباشر لتحسينها.

**انحدار الصفات التناسلية على عدد الشوكات (Fork) على المخطم**  
 يظهر جدول (2) أن انحدار الصفات التناسلية المدروسة على عدد الشوكات على المخطم لم يكن معنويا بلستثناء عدد التلقيحات اللازمة للإخصاب التي كانت معنوية ( $P < 0.05$ )، إذ بلغ معاملته (-0.23) تلقيحة وبمعامل تحديد (0.68) بالتتابع، وهذا يعني بأن عدد التلقيحات اللازمة للإخصاب ينخفض بحدود (-0.23) تلقيحة لكل شوكة اضافية على المخطم، وبلغ معامل انحدار المدة بين الولادة والتلقيح المثمر و الفترة بين الولادتين على عدد الشوكات المحسوبة على المخطم (-8.51) يوم و (-8.05) يوم بالتتابع.

جدول1. معامل انحدار الصفات المدروسة على القوس البسيط (Simple Arch) على المخطم.

معامل التحديد (R <sup>2</sup> )	معادلة الخط المستقيم	مستوى المعنوية	معامل الإنحدار (b)	الصفات المنحدرة على القوس البسيط
0.81	$Y^{\wedge} = 170.57 - 6.31 (X)$	N.S	6.31 - يوم /قوس	المدة من الولادة الى التلقيح المثمر
0.79	$Y^{\wedge} = 3.17 - 0.061 (X)$	**	0.061 - تلقيحة/قوس	عدد التلقيحات اللازمة للإخصاب
0.73	$Y^{\wedge} = 460.41 - 10.84 (X)$	*	10.84 - يوم /قوس	الفترة بين الولادتين

N.S غير معنوي ، \* (P<0.05) ، \*\* (P<0.01).

## جدول 2. معامل انحدار الصفات المدروسة على عدد الشوكات (Fork) على المخطم.

معامل التحديد (R <sup>2</sup> )	معادلة الخط المستقيم	مستوى المعنوية	معامل الإنحدار (b)	الصفات المنحدرة على عدد الشوكات
0.18	$Y^{\wedge} = 170.06 - 8.51 (X)$	N.S	8.51 - يوم/شوكة	المدة من الولادة الى التلقيح المثمر
0.68	$Y^{\wedge} = 3.31 - 0.23 (X)$	*	0.23 - تلقيحة/شوكة	عدد التلقيحات اللازمة للإخصاب
0.55	$Y^{\wedge} = 463.78 - 8.05 (X)$	N.S	8.05 - يوم/شوكة	الفترة بين الولادتين

N.S غير معنوي ، \* (P<0.05).

## انحدار الصفات التناسلية على الإنحباس (Enclosure) على المخطم

يظهر من جدول (3) معامل انحدار عدد التلقيحات اللازمة للإخصاب معنويًا (P<0.05) على عدد الانحباسات على المخطم (0.303) تلقيحة، في حين لم يكن انحدار المدة بين الولادة والتلقيح المثمر ، وكذلك الفترة بين الولادتين عليها معنويًا. إن هذه النتائج تشير الى انه اذا كان الهدف من التحسين هو الصفات التناسلية فلنننتخب العجلات اعتمادا على نقصان الإنحباس (Enclosure) على المخطم. إن قيمة معامل التحديد كانت مرتفعة لمعادلة الخط المستقيم العائدة لعدد التلقيحات اللازمة للإخصاب (0.81) ، وهذا الرقم يبدي تفسير مفاده ان اعتماد صفة الإنحباس في الانتخاب لتحسين الأداء التناسلي للأبقار مستقبلا (تقليل عدد التلقيحات اللازمة للإخصاب) يفسر بحدود (81 %) من امكانية الاعتماد على معادلات التنبؤ الناتجة.

## جدول 3. معامل انحدار الصفات المدروسة على الانحباس (Enclosure) على المخطم.

معامل التحديد (R <sup>2</sup> )	معادلة الخط المستقيم	مستوى المعنوية	معامل الإنحدار (b)	الصفات المنحدرة على الإنحساب
0.23	$Y^{\wedge} = 158.67 + 18.14 (X)$	N.S	18.14 يوم/انحساب	المدة من الولادة الى التلقيح المثمر
0.81	$Y^{\wedge} = 3.06 + 0.303 (X)$	*	0.303 تلقيحة / انحساب	عدد التلقيحات اللازمة للإخصاب
0.16	$Y^{\wedge} = 454.06 + 13.96 (X)$	N.S	13.96 يوم/انحساب	الفترة بين الولادتين

N.S غير معنوي ، \* (P<0.05).

#### انحدار الصفات التناسلية على عدد الجزيرات (Islands) على المخطم

يتضح من الجدول (4) أن معامل انحدار المدة بين الولادة والتلقيح المثمر والفترة بين الولادتين على عدد الجزيرات لم يكن معنوياً، فإن انحدار عدد التلقيحات اللازمة للإخصاب على هذه الصفة كان عالي المعنوية وبلغ معاملته (0.043) تلقيحة وبمعامل تحديد (0.69)، لذا فإن عدد الجزيرات على المخطم كلما انخفض كان أفضل من ناحية تحسين الاداء التناسلي (تقليل عدد التلقيحات اللازمة للإخصاب) لتقليل مدى الجيل وتسريع برامج التحسين.

#### جدول 4. معامل انحدار الصفات المدروسة على الجزيرات (Islands) على المخطم.

معامل التحديد (R <sup>2</sup> )	معادلة الخط المستقيم	مستوى المعنوية	معامل الإنحدار (b)	الصفات المنحدرة على الجزيرات
0.51	$Y^{\wedge} = 167.89 - 3.12 (X)$	N.S	3.12 - يوم / جزيرة	المدة من الولادة الى التلقيح المثمر
0.69	$Y^{\wedge} = 3.11 + 0.043 (X)$	**	0.043 تلقيحة / جزيرة	عدد التلقيحات اللازمة للإخصاب
0.43	$Y^{\wedge} = 456.65 - 1.89 (X)$	N.S	1.89 - يوم / جزيرة	الفترة بين الولادتين

\*\* (P<0.01)، N.S غير معنوي

#### انحدار الصفات التناسلية على عدد الخطوط الجلدية القصيرة (Short Ridges) على المخطم

يتبين من الجدول (5) ان انحدار المدة بين الولادة والتلقيح المثمر (-0.646) يوم وعدد التلقيحات اللازمة للإخصاب (0.0021) تلقيحة فضلاً عن الفترة بين الولادتين (-0.35) يوم على عدد الخطوط الجلدية القصيرة لم يكن معنوياً في هذه الدراسة.

#### انحدار الصفات التناسلية على عرض المخطم (Muzzle Width)



تعد صفة عرض المخطم من الصفات التي من الممكن قياسها بسهولة مقارنة بالمقاييس الأخرى آنفة الذكر، وهذا يدعم امكانية استعمالها في البحوث التطبيقية في استراتيجيات التحسين الوراثي لعدد من الصفات الإنتاجية والتناسلية لدى ابقار الحليب، خصوصا وان بعض الدراسات اشارت الى وجود علاقة موجبة ومعنوية بين عرض المخطم وعدد من الصفات الإنتاجية لدى الجاموس ( Singh و Patel، 2002).

تنخفض المدة بين الولادة والتلقيح المثمر (- 1.12) يوم وكذلك الفترة بين الولادتين بحدود (- 0.301) يوم لكل سنتيمتر واحد اضافي في عرض المخطم، إلا ان هذه التغيرات لم تكن معنوية، في حين عدد التلقيحات اللازمة للإخصاب تقل معنويا ( $P < 0.05$ ) بزيادة عرض المخطم، إذ بلغ معامل الانحدار (- 0.0071) تلقيحة/سم (الجدول 6). إن تقليل عدد التلقيحات اللازمة للإخصاب من شأنه ان يسرع برامج التحسين كونه يقصر الفترة بين الولادتين ومن ثم يقلل من مدى الجيل، كما ان تقليل عدد التلقيحات للإخصاب المثمر يخفض تكاليف الإنتاج ومن ثم رفع العائد الاقتصادي من مشاريع التربية. جدول 5. معامل انحدار الصفات المدروسة على الخطوط الجلدية القصيرة ( Short Ridges ) على المخطم.

معامل التحديد ( $R^2$ )	معادلة الخط المستقيم	مستوى المعنوية	معامل الإنحدار (b)	الصفات المنحدرة على الخطوط الجلدية القصيرة
0.61	$Y^{\wedge} = 35.23 + 0.033(X)$	**	0.033 كغم /خط قصير	المدة من الولادة الى التلقيح المثمر
0.16	$Y^{\wedge} = 3.07 + 0.0021(X)$	N.S	0.0021 تلقيحة/خط قصير	عدد التلقيحات اللازمة للإخصاب
0.38	$Y^{\wedge} = 473.44 - 0.35(X)$	N.S	- 0.35 يوم /خط قصير	الفترة بين الولادتين

\*\* ( $P < 0.01$ )، N.S غير معنوي

جدول 6. معامل انحدار الصفات المدروسة على عرض المخطم (Muzzle Width).

معامل التحديد (R <sup>2</sup> )	معادلة الخط المستقيم	مستوى المعنوية	معامل الإنحدار (b)	الصفات المنحدرة على عرض المخطم
0.51	$Y^{\wedge} = 184.00 - 1.12(X)$	N.S	1.12 - يوم / سم	المدة من الولادة الى التلقيح المثمر
0.44	$Y^{\wedge} = 3.03 - 0.0071(X)$	*	0.0071 - تلقيحة / سم	عدد التلقيحات اللازمة للإخصاب
0.19	$Y^{\wedge} = 453.17 - 0.301(X)$	N.S	0.301 - يوم / سم	الفترة بين الولادتين

\* (P<0.05)، N.S غير معنوي

#### المصادر

- Bindusar, K. S. 2003. Befriend mouse for livestock's sake, The Tribune, Log In Tribune.
- Buzz, R. 2004. "Apparatus and method for identifying individuals through their Retinal vasculature patterns". The US patent 4,109,237 (August 22), Jean-François, Mainguet.  
[www.optibrand.com/uploadedfiles/Animal\\_ID.pdf](http://www.optibrand.com/uploadedfiles/Animal_ID.pdf).
- Johnson, J. 1999. February. An identity crisis. Beef Today, pp. 7-11.  
[www.ca.uky.edu/agc/pubs/asc/asc130/asc130.htm](http://www.ca.uky.edu/agc/pubs/asc/asc130/asc130.htm).
- Maciej, H. 2005. Gray Whales Research In Mexico. International Wildlife Coalition. [whales@pmmrc.org](mailto:whales@pmmrc.org).
- Olson, C. 2000. USDA wants mandatory ID. National Cattleman, pp. 3-4.
- Parna, E., A. S. Baranov and A. V. Yablokov. 1996. Association studies on production and muzzle dermatoglyphic in Estonian cattle of different genetic origin. XXVth International Conference on Animal Genetics. ISAG International Society for Animal Genetics. Section E: Association between markers and traits. 21-25 July 1996. Tours - France. 166.
- SAS . 2001. SAS / STAT Users Guide for Personal Computers. Release 6.12. SAS Institute Inc., Cary, NC., USA. (SAS = Statistical Analysis System).
- Shlachter, B. 2001. U.S. debates tagging, ranchers worry about costs, but some say advantages make traceability inevitable. The Fort Worth Star-Telegram, pp. 7-9.
- Shmael, W. 2001. To ID, or not to ID BEEF ?, pp. 3-12.  
[www.pipevet.com/articles/Identification%20Options.htm](http://www.pipevet.com/articles/Identification%20Options.htm).

- Simon, C. and I. Goldstein. 1935. A New Scientific Method of Identification. New-York State Journal of Medicine, Vol. 35, No. 18, pp. 901-906, Sept.
- Singh, N. P. and A. M. Patel . 2002. Dermatoglyphic and Performance . Gujarat Agricultural University, Anand, Gujarat 388001, India. Buffalo Bulletin (March 2002) Vol. 21, No.1. Indian Journal of Animal Sciences (2001). 71(11): 1062-1065. 2-5611369.
- Tower, P. 1955. The fundus Oculi in Monozygotic twins: Report of six pairs of identical twins, Archives of Ophthalmology, Vol. 54, pp. 225-239.
- Wilcox, J. 1998. Positive ID. Successful Farming, pp. 4-7.  
[www.joe.org/joe/2002december/rb3.shtml](http://www.joe.org/joe/2002december/rb3.shtml).

## **PREDICTION OF THE HOLSTEIN CATTLE REPRODUCTIVE FROM ANALYSIS OF THE DERMATOGLYPHICS ON MUZZLE.**

**Al-Anbari , N.N.\* Al-Robaibi, A.A \*\* Al-Bajalany, L.Y\*\*\***

**\* Dept.of Animal Resources - College of Agric. - Univ. of Baghdad**

**\*\*Dept.of Animal Resources - College of Al-Mussayab Technical**

**\*\*\*Dept.of Animal Resources - Kalar Inst.**

### **ABSTRACT**

At the Nasr Dairy Cattle Station, United Company for Animal Resources Ltd., Al-Soueira (50 km south of Baghdad), (246) Holstein cows were randomly selected out from the herd. The aim of this study was to recognize the dermatoglyphics on the muzzle, the photography and a special computer programs were used to analysis the dermatoglyphics, were Simple Arch (SA), Fork (F), Enclosure (E), Islands (I), Short Ridges (SR) and Muzzle Width (MW) were recorded. A prediction relationship between dermatoglyphics and some reproductive traits {period from calving to service (PCS), service per conception (SPC), and calving interval (CI)}, genetic parameters estimate, the (246) Holstein cows at the station were evaluated genetically as to their (MW). Regression coefficient of some reproductive traits on dermatoglyphics, were significantly (positive or negative).